

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類
(每 10 萬人口)，民國 98 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2009

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	全癌症 (總計) ALL SITES
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C00-C14 ⁴	□腔、□咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
	□腔 ⁵ ORAL CAVITY
	□咽 ⁵ OROPHARYNX
	下咽 ⁵ HYPOPHARYNX
C00	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外) LIP (excludes skin of lip C44.0)
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	□底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	□腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	□咽 OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、□腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. □腔、□咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考第 22 頁的說明。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
87,189	377.12	262.53	293.38	49,022	421.27	299.56	336.25	38,167	332.38	228.35	253.49	C00-C80
8,256	35.71	26.10	28.20	7,241	62.23	46.51	50.11	1,015	8.84	6.24	6.85	C00-C14
6,480	28.03	20.37	21.98	5,927	50.93	37.95	40.83	553	4.82	3.28	3.64	C00-C14 ⁴
911	3.94	2.86	3.07	885	7.61	5.67	6.08	26	0.23	0.16	0.17	
4,374	18.92	13.78	14.90	3,939	33.85	25.29	27.25	435	3.79	2.57	2.86	
1,195	5.17	3.73	4.01	1,103	9.48	7.00	7.51	92	0.80	0.55	0.61	
212	0.92	0.66	0.72	185	1.59	1.20	1.28	27	0.24	0.14	0.17	C00
1,850	8.00	5.82	6.30	1,614	13.87	10.33	11.15	236	2.06	1.42	1.56	C01-C02
403	1.74	1.24	1.34	358	3.08	2.23	2.42	45	0.39	0.28	0.30	C03
141	0.61	0.44	0.47	126	1.08	0.81	0.87	15	0.13	0.08	0.10	C04
2,296	9.93	7.27	7.85	2,143	18.42	13.81	14.85	153	1.33	0.91	1.02	C05-C06
658	2.85	2.05	2.20	609	5.23	3.86	4.14	49	0.43	0.28	0.31	C09-C10
874	3.78	2.74	2.94	851	7.31	5.45	5.84	23	0.20	0.14	0.15	C12-C13
46	0.20	0.15	0.16	41	0.35	0.27	0.29	5	0.04	0.03	0.03	C14
272	1.18	0.90	0.98	152	1.31	1.01	1.10	120	1.05	0.80	0.86	C07-C08
1,504	6.51	4.82	5.24	1,162	9.99	7.55	8.18	342	2.98	2.16	2.35	C11
32,546	140.77	95.86	108.16	20,946	180.00	127.65	143.06	11,600	101.02	65.64	74.90	C15-C26, C48

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類
(每 10 萬人口)，民國 98 年 (續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2009 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
2,048	8.86	6.27	6.84	1,898	16.31	11.94	12.97	150	1.31	0.83	0.95	C15
3,848	16.64	10.67	12.42	2,404	20.66	13.57	15.86	1,444	12.58	7.95	9.18	C16
327	1.41	0.97	1.09	200	1.72	1.23	1.38	127	1.11	0.72	0.82	C17
12,488	54.01	36.34	41.35	7,151	61.45	42.86	48.65	5,337	46.48	30.25	34.48	C18-C21
7,587	32.82	21.78	24.97	4,214	36.21	24.86	28.49	3,373	29.37	18.92	21.69	C18
4,901	21.20	14.57	16.37	2,937	25.24	18.00	20.16	1,964	17.10	11.33	12.79	C19-C21
11,080	47.92	33.58	37.31	7,747	66.57	48.68	53.60	3,333	29.03	19.13	21.69	C22
930	4.02	2.64	3.04	493	4.24	2.94	3.35	437	3.81	2.37	2.76	C23-C24
1,648	7.13	4.68	5.40	962	8.27	5.70	6.51	686	5.97	3.72	4.35	C25
135	0.58	0.56	0.56	73	0.63	0.61	0.61	62	0.54	0.52	0.50	C48
42	0.18	0.14	0.15	18	0.15	0.12	0.13	24	0.21	0.15	0.16	C26
11,829	51.16	33.95	38.90	7,667	65.89	44.74	51.62	4,162	36.24	23.87	26.94	C30-C39
206	0.89	0.65	0.71	127	1.09	0.82	0.89	79	0.69	0.50	0.55	C30-C31
613	2.65	1.88	2.07	581	4.99	3.66	4.01	32	0.28	0.20	0.22	C32
10,643	46.03	30.19	34.81	6,737	57.89	38.75	45.08	3,906	34.02	22.22	25.16	C33-C34
44	0.19	0.14	0.15	30	0.26	0.19	0.21	14	0.12	0.09	0.09	C38.4
323	1.40	1.09	1.16	192	1.65	1.31	1.42	131	1.14	0.86	0.92	C37-C38.3, C38.8

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類
(每 10 萬人口)，民國 98 年 (續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2009 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C42	造血系統及網狀內皮系統 (白血病除外) HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)
C42⁶	白血病 LEUKEMIA
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES
C44	皮膚 SKIN
C44⁷	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	女性乳房 FEMALE BREAST
C50	男性乳房 MALE BREAST
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

7. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
476	2.06	1.37	1.57	288	2.47	1.69	1.94	188	1.64	1.08	1.23	C42
1,852	8.01	6.69	7.04	1,093	9.39	7.81	8.29	759	6.61	5.60	5.82	C42 ⁶
183	0.79	0.76	0.77	97	0.83	0.77	0.80	86	0.75	0.75	0.75	C40-C41
515	2.23	1.77	1.89	307	2.64	2.16	2.30	208	1.81	1.38	1.49	C47, C49
2,928	12.66	8.10	9.49	1,589	13.66	9.17	10.65	1,339	11.66	7.08	8.38	C44
258	1.12	0.76	0.86	136	1.17	0.81	0.91	122	1.06	0.72	0.80	C44 ⁷
2,670	11.55	7.34	8.63	1,453	12.49	8.37	9.73	1,217	10.60	6.37	7.57	C44
8,926	77.73	55.44	59.91	-	-	-	-	8,926	77.73	55.44	59.91	C50
48	0.41	0.27	0.31	48	0.41	0.27	0.31	-	-	-	-	C50
4,566	39.76	27.95	30.53	-	-	-	-	4,566	39.76	27.95	30.53	C51-C58
14	0.12	0.09	0.10	-	-	-	-	14	0.12	0.09	0.10	C55
1,796	15.64	10.73	11.87	-	-	-	-	1,796	15.64	10.73	11.87	C53
1,496	13.03	9.20	9.92	-	-	-	-	1,496	13.03	9.20	9.92	C54
1,113	9.69	7.12	7.70	-	-	-	-	1,113	9.69	7.12	7.70	C56, C57.0-C57.4
147	1.28	0.81	0.95	-	-	-	-	147	1.28	0.81	0.95	C51-C52, C57.7-C57.9
4,272	36.71	24.52	28.93	4,272	36.71	24.52	28.93	-	-	-	-	C60-C63

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類
(每 10 萬人口)，民國 98 年 (續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2009 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT
C67	膀胱 BLADDER
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C71	腦 BRAIN
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM
C73	甲狀腺 THYROID GLAND
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
4,013	34.49	22.60	26.89	4,013	34.49	22.60	26.89	-	-	-	-	C61
168	1.44	1.36	1.41	168	1.44	1.36	1.41	-	-	-	-	C62
91	0.78	0.56	0.62	91	0.78	0.56	0.62	-	-	-	-	C60,C63
4,359	18.85	12.49	14.35	2,691	23.13	15.82	18.16	1,668	14.53	9.34	10.73	C64-C68
2,003	8.66	5.50	6.46	1,419	12.19	8.07	9.42	584	5.09	3.10	3.66	C67
937	4.05	2.90	3.21	604	5.19	3.77	4.20	333	2.90	2.07	2.26	C64
731	3.16	2.13	2.42	359	3.09	2.16	2.44	372	3.24	2.10	2.40	C65
406	1.76	1.14	1.33	164	1.41	0.95	1.10	242	2.11	1.32	1.54	C66
25	0.11	0.07	0.08	19	0.16	0.11	0.13	6	0.05	0.03	0.04	C68.0-C68.1
10	0.04	0.03	0.03	5	0.04	0.04	0.04	5	0.04	0.03	0.03	C68.8
247	1.07	0.71	0.81	121	1.04	0.73	0.82	126	1.10	0.70	0.80	C68.9
49	0.21	0.26	0.23	25	0.21	0.21	0.21	24	0.21	0.31	0.27	C69
667	2.88	2.68	2.72	391	3.36	3.16	3.21	276	2.40	2.19	2.23	C70-C72
577	2.50	2.34	2.37	351	3.02	2.84	2.89	226	1.97	1.83	1.86	C71
90	0.39	0.34	0.35	40	0.34	0.32	0.32	50	0.44	0.36	0.37	C70, C72
2,414	10.44	7.94	8.63	568	4.88	3.72	4.06	1,846	16.08	12.14	13.17	C73
58	0.25	0.31	0.28	31	0.27	0.35	0.31	27	0.24	0.25	0.24	C74-C75

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類
(每 10 萬人口)，民國 98 年 (續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2009 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES 惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
10	0.04	0.03	0.03	2	0.02	0.02	0.02	8	0.07	0.04	0.05	C76
892	3.86	2.49	2.88	470	4.04	2.68	3.10	422	3.67	2.30	2.66	C80
2,340	10.12	7.48	8.23	1,295	11.13	8.30	9.17	1,045	9.10	6.72	7.33	

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 98 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病

LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)

急性淋巴芽細胞白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)

慢性淋巴球白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)

急性骨髓樣白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)

慢性骨髓樣白血病

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)

其他類型白血病⁸

LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

8. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
1,852	8.01	6.69	7.04	1,093	9.39	7.81	8.29	759	6.61	5.60	5.82
241	1.04	1.56	1.36	137	1.18	1.73	1.51	104	0.91	1.37	1.20
124	0.54	0.36	0.41	81	0.70	0.47	0.55	43	0.37	0.25	0.28
669	2.89	2.20	2.40	389	3.34	2.51	2.77	280	2.44	1.90	2.05
219	0.95	0.74	0.80	132	1.13	0.91	0.99	87	0.76	0.57	0.62
599	2.59	1.85	2.06	354	3.04	2.18	2.46	245	2.13	1.53	1.68
2,340	10.12	7.48	8.23	1,295	11.13	8.30	9.17	1,045	9.10	6.72	7.33
172	0.74	0.66	0.69	90	0.77	0.66	0.70	82	0.71	0.66	0.69
2,168	9.38	6.83	7.53	1,205	10.36	7.64	8.47	963	8.39	6.06	6.64

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 98 年【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病

LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASMS, TOTAL

急性骨髓樣白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA

復發性遺傳變異之急性骨髓樣白血病

AML with recurrent genetic abnormalities (ICD-O-3 M-98663、M-98713、M-98963、M-98973)

骨髓增生不良相關轉變之急性骨髓樣白血病

AML with myelodysplasia-related changes (ICD-O-3 M-98953)

治療相關之骨髓瘤

Therapy-related myeloid neoplasms (ICD-O-3 M-99203)

非特定急性骨髓樣白血病

Acute myeloid leukemia, NOS (ICD-O-3 M-98613)

其他急性骨髓樣白血病

Other acute myeloid leukemia (ICD-O-3 M-98403、M-98673、M-98703、M-98723、M-98733、M-98743、M-98913、M-99103、M-99313)

骨髓樣肉瘤

Myeloid sarcoma (ICD-O-3 M-99303)

芽細胞漿性樹突狀細胞瘤

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (ICD-O-3 M-97273)

急性淋巴芽細胞白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

B 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤

B lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97283、M-98363)

T 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤

T lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97293、M-98373)

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
1,896	8.20	6.90	7.24	1,116	9.59	8.02	8.50	780	6.79	5.82	6.03
728	3.15	2.43	2.64	431	3.70	2.86	3.12	297	2.59	2.02	2.18
100	0.43	0.39	0.41	51	0.44	0.43	0.43	49	0.43	0.36	0.38
40	0.17	0.11	0.13	28	0.24	0.17	0.19	12	0.10	0.06	0.07
9	0.04	0.03	0.03	4	0.03	0.03	0.03	5	0.04	0.03	0.04
216	0.93	0.65	0.74	138	1.19	0.81	0.93	78	0.68	0.50	0.55
351	1.52	1.18	1.28	201	1.73	1.34	1.46	150	1.31	1.03	1.10
6	0.03	0.03	0.03	6	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-
6	0.03	0.03	0.03	3	0.03	0.03	0.03	3	0.03	0.03	0.03
180	0.78	1.13	1.00	101	0.87	1.21	1.09	79	0.69	1.03	0.92
127	0.55	0.85	0.74	65	0.56	0.87	0.74	62	0.54	0.83	0.73
53	0.23	0.28	0.27	36	0.31	0.34	0.34	17	0.15	0.20	0.19

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 98 年【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

慢性骨髓樣白血病

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633、M-99643)

慢性淋巴球白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-96703、M-98233)

系統歧異不明之急性白血病

ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE (ICD-O-3 M-98013)

骨髓增生惡性病

MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (ICD-O-3 M-97403、M-97413、M-97423、M-99503、M-99603、M-99613、M-99623、M-99753)

骨髓造血不良症候群

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (ICD-O-3 M-99803、M-99823、M-99833、M-99843、M-99853、M-99863、M-99873、M-99893)

急性混合型白血病

ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98053)

非特定淋巴芽細胞白血病

LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98353)

其他白血病

OTHER LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98203、M-98323、M-98603)

非特定白血病

LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98003)

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
220	0.95	0.74	0.81	133	1.14	0.92	1.00	87	0.76	0.57	0.62
157	0.68	0.46	0.52	99	0.85	0.59	0.68	58	0.51	0.33	0.38
31	0.13	0.09	0.10	15	0.13	0.09	0.10	16	0.14	0.09	0.10
206	0.89	0.64	0.71	109	0.94	0.71	0.78	97	0.84	0.58	0.64
245	1.06	0.67	0.79	158	1.36	0.85	1.03	87	0.76	0.51	0.57
10	0.04	0.05	0.05	4	0.03	0.04	0.04	6	0.05	0.05	0.05
95	0.41	0.62	0.53	56	0.48	0.68	0.60	39	0.34	0.54	0.46
6	0.03	0.02	0.02	3	0.03	0.02	0.02	3	0.03	0.02	0.02
18	0.08	0.06	0.06	7	0.06	0.03	0.04	11	0.10	0.09	0.09

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 98 年【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503、M-96513、M-96523、M-96533、M-96593、M-96613、M-96623、M-96633、M-96643、M-96653、M-96673)

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA

B 細胞淋巴樣瘤

B-cell lymphoid neoplasms

邊緣區淋巴瘤（脾、結節內、與黏膜相關淋巴樣組織）

Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT) (ICD-O-3 M-96893、M-96993)

MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)

淋巴漿細胞性淋巴瘤

Lymphoplasmacytic lymphoma (ICD-O-3 M-96713、M-97613)

濾泡性淋巴瘤

Follicular lymphoma (ICD-O-3 M-96753、M-96903、M-96913、M-96953、M96983)

外套細胞淋巴瘤

Mantle cell lymphoma (ICD-O-3 M-96733)

Burkitt 氏淋巴瘤

Burkitt lymphoma (ICD-O-3 M-96873、M-98263)

瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型)

Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype) (ICD-O-3 M-96803、M-96843)

原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (ICD-O-3 M-96793)

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
2,787	12.05	8.69	9.64	1,568	13.47	9.82	10.95	1,219	10.62	7.63	8.39
172	0.74	0.66	0.69	90	0.77	0.66	0.70	82	0.71	0.66	0.69
2,615	11.31	8.03	8.95	1,478	12.70	9.16	10.25	1,137	9.90	6.96	7.70
1,629	7.05	5.01	5.56	875	7.52	5.46	6.08	754	6.57	4.58	5.06
218	0.94	0.66	0.74	104	0.89	0.61	0.70	114	0.99	0.72	0.77
80	0.35	0.24	0.27	37	0.32	0.22	0.25	43	0.37	0.26	0.29
23	0.10	0.07	0.08	17	0.15	0.10	0.12	6	0.05	0.04	0.04
205	0.89	0.63	0.69	115	0.99	0.72	0.79	90	0.78	0.56	0.60
56	0.24	0.16	0.18	42	0.36	0.25	0.28	14	0.12	0.08	0.09
52	0.22	0.22	0.22	30	0.26	0.25	0.25	22	0.19	0.19	0.18
1,056	4.57	3.18	3.58	557	4.79	3.45	3.87	499	4.35	2.92	3.30
13	0.06	0.06	0.06	4	0.03	0.03	0.03	9	0.08	0.08	0.08

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 98 年【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

其他 B 細胞淋巴瘤

Other B-cell lymphomas (ICD-O-3 M-95963、M-96783、M-98333、M-99403)

T/NK 細胞淋巴瘤

T/NK-cell lymphoid neoplasms

鼻型及其它結節外 NK/T 細胞淋巴瘤

Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type (ICD-O-3 M-97193)

皮膚型 T 細胞淋巴瘤（包含蕈樣菌症 / Sezary 氏症候群）

Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sèzary syndrome) (ICD-O-3 M-97003、M-97013、M-97093、M-97183)

腸病型 T 細胞淋巴瘤

Enteropathy-type T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97173)

肝脾 T 細胞淋巴瘤

Hepatosplenic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97163)

皮下脂膜炎樣 T 細胞淋巴瘤

Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma (ICD-O-3 M-97083)

非特定周圍性 T 細胞淋巴瘤

Peripheral T-cell lymphoma, NOS (ICD-O-3 M-97023)

血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97053)

退行分化型大細胞淋巴瘤

Anaplastic large cell lymphoma (ICD-O-3 M-97143)

成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病

Adult T-cell lymphoma / leukemia (ICD-O-3 M-98273)

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
6	0.03	0.02	0.02	6	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-
332	1.44	1.06	1.17	216	1.86	1.39	1.53	116	1.01	0.75	0.83
64	0.28	0.19	0.22	41	0.35	0.25	0.28	23	0.20	0.14	0.16
50	0.22	0.17	0.18	31	0.27	0.20	0.22	19	0.17	0.14	0.15
4	0.02	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.01
1	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	1	0.01	0.01	0.01
7	0.03	0.03	0.03	3	0.03	0.03	0.03	4	0.03	0.03	0.03
99	0.43	0.31	0.34	71	0.61	0.46	0.51	28	0.24	0.16	0.19
47	0.20	0.14	0.16	28	0.24	0.17	0.19	19	0.17	0.10	0.12
45	0.19	0.16	0.17	31	0.27	0.22	0.23	14	0.12	0.11	0.11
15	0.06	0.05	0.06	9	0.08	0.06	0.06	6	0.05	0.05	0.05

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 98 年【依據 WHO 2008 年的分類編修¹】（續完）
CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2009 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

漿細胞瘤

Plasma cell neoplasm (ICD-O-3 M-97313、M-97323、M-97333、M-97343)

其他淋巴增生疾病

Other LPD

組織細胞與樹突狀細胞瘤

Histiocytic and dendritic cell neoplasms (ICD-O-3 M-97513、M-97553、M-97563、M-97573、M-97583)

其他與非特定惡性淋巴瘤

Malignant lymphoma, NOS and others (ICD-O-3 M-95903、M-95913、M-97503、M-97543、M-97603、M-97643)

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.507 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
476	2.06	1.37	1.57	286	2.46	1.67	1.92	190	1.65	1.08	1.23
6	0.03	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.01	4	0.03	0.03	0.03
6	0.03	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.01	4	0.03	0.03	0.03
172	0.74	0.58	0.62	99	0.85	0.64	0.70	73	0.64	0.52	0.55

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.